

Dr. Timothy Cheang / Dr. Simon Yang / Dr. Jennifer Li

141 Main Street, Unionville, Ontario L3R 2G7

Tel: (905)477-5935 Fax: (905)477-5936

admin@unionvilleg.com

結腸鏡檢查

日期：_____

登記時間：上午 / 下午 _____ 時
(檢查於 _____ 開始)

檢查當天：

- 請攜帶有效的安省醫療卡及你現有的藥物到 Markham Stouffville Hospital Patient Registration 登記。
- 由於你曾接受靜脈鎮靜劑注射，檢查後絕對不可駕駛或乘搭公共交通工具，請安排家人或朋友開車接送。

注意：在結腸鏡檢查前 4 天禁食堅果/籽類。

5 天前停用以下藥物，如果不明白，詢問你的醫生：

- Blood thinners 血液稀釋劑(e.g. Coumadin, Warfarin)
- Anti-platelets 抗血小板: Ticlid or Plavix
- Aspirin (ASA) 阿司匹靈
- Iron supplements 鐵丸

關於糖尿病藥物，請向你的醫生查詢

如你正在服血壓丸，請在檢查當天用少量清水送服，其他藥物請於檢查後服用

如需改期或取消，請提供最少兩星期通知，否則將被罰款

\$300。

結腸鏡檢查前準備

請在結腸鏡檢查前一整天及檢查當天禁食固體食物 (包括粥). 不能喝奶類飲品，豆漿

飲品

- 僅服用清澈透明飲品，直至檢查前 2 小時: (確保全天喝 3 到 4 升無色液體)
例如:水，清雞湯，蘋果汁，白葡萄汁，透明的汽水 (雪碧)，咖啡/茶 (不加奶)，啫喱/果凍(綠色，黃色，橙色) Gatorade/Powerade (白色, 黃色)

禁止: 奶類飲品，酒精飲料，粥或無法透視的飲品。

藥: Bi-PegLyte (請提前數天去藥房買 Bi-PegLyte; 如沒有 Bi-Peglyte，請購買 4 公升 Peglyte 及三片 Dulcolax 藥丸。按醫生指示，你只需要 2 公升，剩餘的不需要。)

- 檢查前一天下午 2 時**，用水服用 3 片 Bisacodyl (共 15 毫克)。在服用 Bisacodyl 藥片後一個小時內不得服用解酸劑。
- 檢查前一天晚上 6 時**，將一包藥粉倒入 1 公升的水中，攪拌至溶解。每 10 分鐘快速喝下一杯直至 1 公升喝完。(250 毫升一杯, 共 4 杯)
- 檢查前一天晚上 9 時**，將一包藥粉倒入 1 公升的水中，攪拌至溶解。每 10 分鐘快速喝下一杯直至 1 公升喝完。(250 毫升一杯, 共 4 杯)
- 檢查前 3 小時禁止服用任何飲料**

檢查後你將被告知是否需要覆診。

如需覆診，請致電 905-477-5935

Email: admin@unionvilleg.com 預約。